P(n)= Propriedade de construção de triângulos retângulos do quadro da projeção da função esfera: para o conjunto dos triangulos retângulos simétricos, cuja a existência se aplique a um conjunto de dos triangulos retângulos simétricos, >= a um subconjunto de dos triangulos retângulos simétricos,números “a”(lembrando que essa propriedade trás em seu interior a propriedade de ser limite inferior dos conjuntos que geram a função e a jpropriedade de mínimo).

.

Padrão, somar termo da proporção

+38/+29. +24. Para n=7
+51/+38. +30. Para n=9
+62/+51. +34. Para n=11

+71/+62. +40. Para n=13
+84/+71 +44. Para n=15
+95/+84 +50. Para n=17

+104/+95 +54 Para n=19
+117/+104 +60. Para n=21
+128/+117 +64. Para n=23

+137/+128. +70 Para n=25
+150/+137. +74 Para.n=27
+161/+150 +80 Para n=29

n. 1,2,3….(n-1)

+a= +29 +(+n-1)(33)
+a’= +a+9
+a”= +a’+13
+a”’= +a+11

,

1° grupo. +7,+9,+11
2° grupo. +13,+15,+17
3° grupo. +19,+21,+,23
4° grupo. +25,+27,+29

(n-1)grupo

Para o padrão +6 e +4

b= (16)*(n-1) +24
b’= (14)*(n-1)+30
b”= (16)*(n -1)+34
b””’=(14)*(n-1)+40

+B = (n-1)*+16 +24 +B=(n-1)+14+50
+B' =.(n-1) *14 +30 +B =(n-1)+16+54
+B" = (n-1) *16.+34. +B= (n-1)+14+60

O primeiro é ímpar o segundo é par e and so on n
são os número ordinal dos grupos
Os padrões +6 e +4 formam as triades, alternando esses números, usando os números ordinais nas equações
A partir do 5° grupo as medidas dos triangulos retângulos e as medidas geradas pelos padrões algébricos se tornam iguais, havendo apenas a questão das ordenações diferentes das normais presentes em ideias de cubos, nas casas 12,20,28,38…,essas ordenações tem função de tornar possíveis capacidades superiores, mesmo na realidade elementar, alteram as medidas dos triângulos presentes nas vizinhanças desses cubos, com alterações de natureza simétrica quando verificados as medidas entre os dois triangulos retângulos perfeitos entre os cubos dos referidos cubos
Chamaremos de p(+7) a propriedade de construção do primeiro triângulo retângulo e como demostramos é verdadeira Sera nosso p(+a) do princıpio de indução. Chamaremos de p(+9) a mesma propriedade de , de construção do triângulo retângulo , e seja maior que P(+7), chamaremos +9 de-+k,e sera o p(+k) do nosso princıpio de indução, logo suponhamos p(+11) como tendo mesma propriedade, e respeitando as mesmas condições, chamando +11 de+ k',
e sera o p(+k') do nosso princıpio de indução. E sabendo que a propriedade é a mesma para os casos escolhidos. Estamos supondo p(k) verdadeira. E fazendo Correspondencia entre p(+a) e p(+k) e p(+k') do nosso princıpio de indução.
Se a suposição de p(+9)=p(+k) ser verdadeira, então vamos mostrar que a propriedade ĕ verdadeira para p(+k'), Para tanto so precisamos provar que +k'> +k isso jâ foi feito, porque a o segundo esta contido e é menor que o interior da terceiro . Para +k'= temos que p(+11)=p(+k'), logo p(+k') ĕ verdadeira. Logo p(+n) é verdadeira Logo , prova-se para os +n triângulos retângulos para a propriedade.

Criada por Lucio Marcos Lemgruber